

KVBW · Postfach 80 06 08 · 70506 Stuttgart

An alle
Internisten mit Schwerpunkt Diabetes,
Gynäkologen und
Hausärzte

Der Vorstand

Albstadtweg 11
70567 Stuttgart

Telefon 0711 7875-3660
Telefax 0711 7875-3274
Sprechstundenbedarf@kvbawue.de

30. Juni 2021

„Geschüttelt, nicht gerührt“

– Oraler Glukose-Toleranztest – Bezug über Sprechstundenbedarf

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn James Bond bei der erneuten Besprechung mit den Krankenkassenverbänden nicht anwesend war – der Kompromiss, den wir im Nachgang mit den Krankenkassen vereinbart haben, hätte ihm geschmeckt.

Wir konnten die Kassen zwar nicht zu einer Aufnahme der NRF Rezeptur 13.8.- Glucose-Lösung für den oralen Toleranztest- bewegen, da die Kosten pro Flasche mit über 20 € den Krankenkassen weiterhin zu teuer sind.

Aber, ganz im Sinn des James Bond Wodka Martini, konnten wir einen Kompromiss schließen, der Ihnen hoffentlich die Arbeit im Praxisalltag erleichtern wird.

- Für den oralen Glukosetoleranztest (oGTT, EBM 01777) besteht die Möglichkeit, sich das **Glucose-Monohydrat- Pulver direkt durch die Apotheke in eine 300ml Gewindeflasche abfüllen zu lassen** (82,5 g Glucose- Monohydrat entsprechen 75 g wasserfreier Glucose). Dabei auf dem Rezept das Abfüllen in die Flasche rezeptieren.
Beispiel für eine Verordnung auf Sprechstundenbedarf: 10 x 82,5 g Glucose- Monohydrat in jeweils einer 300ml Gewindeflasche als Abgabegefäß.
Die Kosten für die Flaschen übernehmen die Gesetzlichen Krankenkassen. Es entstehen Ihnen dabei keine zusätzlichen Kosten.
- In die Flasche mit dem Pulver geben Sie dann unmittelbar vor Gebrauch 300 ml Wasser. (Siehe auch S3 Leitlinie der DDG und DGGG zum Thema Gestationsdiabetes mellitus, Diagnose, Therapie und Nachsorge, 2018). Dabei hilft Ihnen der Eichstrich an der 300 ml Flasche.
- Deckel drauf – und jetzt wiederholt schütteln, bis sich das Pulver vollständig gelöst hat.
- Zur Personalisierung können Sie die Flasche mit dem jeweiligen Patientennamen versehen. Auch ist es möglich, dass nach dem vollständigen Auflösen des Pulvers der Patient direkt schluckweise aus der Flasche trinken kann.

Falls Ihnen die flaschengeschüttelte Variante nicht schmeckt, können Sie **auch weiter wie bisher das portionsweise abgepackte Glucose-Monohydrat-Pulver im Papierflachbeutel in der Apotheke als Sprechstundenbedarf beziehen**

Beispiel für eine Verordnung: 10 x 82,5 g Glucose- Monohydrat. Ohne weitere Angaben füllt der Apotheker das Pulver automatisch in den Flachbeutel.

ACHTUNG:

Vortest auf Gestationsdiabetes (EBM 01776) bleibt alles beim Alten: Hier darf **keine Flaschenabfüllung als Sprechstundenbedarf verordnet werden, sondern ausschließlich Glucose- Monohydrat- Pulver im Flachbeutel** (55 g Glucose- Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose).

WEITERHIN WICHTIG:

Keine als Lebensmittel deklarierte Produkte verordnen, diese werden von den Krankenkassen beanstandet.

Mit den besten kollegialen Grüßen
Ihr



Dr. Norbert Metke

Vorsitzender des Vorstandes